



【問い】 検診で前立腺特異抗原（PSA）が8.68と言われました。排尿時に尿の切れが悪く、残尿感もあり、夜中に1、2回起きてしまいます。何科を受診して、どんな検査を受ければよいのでしょうか。

（男性、68歳）

前立腺がんの検査

A

Q

織を採取して調べると10人中2・5〜3人ががんが見つかることされています。

がん検診などでPSA値が正常値を超えた場合、泌尿器科を受診して詳しい検査を受けてください。初めに、①検尿②直腸側から前立腺の状態を触って確かめる「直腸診」③超音波（エコー）の3種の検査を受けま

【答え】 PSAは前立腺から分泌されるタンパク質で、血液中の値を測ることで前立腺の異常を探知します。1μg以下は4μg以下で正常とされ、10μg以上で前立腺がんが疑われま

す。前立腺は膀胱の出口の下に位置し、クルミ大の臓器です。がんがあれば一部が硬く、肥大

このコーナーに相談したい具体的な症状をお寄せください。採用分について医師がお答えします。〒650-8571 神戸新聞社 文化生活部。下記のフアクス番号、メールアドレスでも受け付けます。住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。

てもらいいます。がんの可能性が低くても、PSA値が正常値を超えている人は3カ月おきに検査を受ける必要があります。

泌尿器科で直腸診やエコーを

す。4〜10μgはグレーゾーンです。

症なら大きくなっているので、指で触れば状態が詳しくわかります。また、エコーでも大きさや形態を確かめることができま

問いの方はPSA値がグレーゾーンです。症状から肥大病が疑われますが、年齢的にもがんやがんと肥大病を併発している

可能性が考えられます。炎症や肥大病は良性の疾患ですが、がんは命を脅かす悪性の疾患で

す。この段階でがんが疑われれば、必要に応じて磁気共鳴画像装置（MRI）の検査やさら

かに泌尿器科で検査を受けましょう。

す。検査でがんを見極めていくことが最も重要になります。グレーゾンの場合、前立腺の組

装（MRI）の検査やさら

（兵庫県医師会、寺尾秀治 西宮市、泌尿器科・てらおクリニック院長）